

nistes; mais les caractères sur lesquels ces espèces ont été fondées ont si peu de valeur, que nous n'avons pas cru devoir nous y arrêter; c'est pourquoi nous avons réuni tous ces individus à leur type primitif dont on n'eût jamais dû les séparer.

\* Lobes du calice entiers. Rameaux florifères sans aiguillons.

- α. R. *Cinnamomea flore simplici, ramis floriferis inermibus, caule aculeato, floribus sub-corymbosis.* (N.)  
 R. *Cinnamomea*, NOUV. DUHAM. vol. 7, p. 14, var. α. SMITH, *Engl. Bot. Tab.* 2388.  
 R. *Cinnamomea globosa*. DESV. *Journ. Bot.* 1813, p. 120, var. α.  
 R. *Odore Cinnamomi simplex*. C. B. *Pin.* 483, n° 7.  
 β. R. *Cinnamomea flore pleno*. CLUS. *Hist.* 115, *cum fig.* NOUV. DUHAM. l. c. var. β.  
 C. B. l. c. Celle-ci ne diffère de la précédente que par ses fleurs doubles.  
 γ. R. *Cinnamomea rubrifolia*.  
 R. (*Rubrifolia*). WILLD. PERS. VILL. REDOUTÉ R. p. et fig. 31.  
 R. *Cinnamomea oblonga*. DESV. l. c. var. δ. Le tube du calice, d'abord oblong, s'arrondit à la maturité.  
 δ. R. *Cinnamomea glauca*. DESV. l. c. var. ξ.  
 R. (*Glauca*). DESF. *Hort. P.* Il ressemble au précédent; mais le tube du calice est globuleux.

\*\* Lobes du calice entiers. Rameaux florifères aiguillonnés.

- ε. R. *Cinnamomea majalis*. RAU. *En. Ros.* p. 53, v. 2. REDOUTÉ R. p. et fig. 105.  
 R. *Cinnamomea* L. *spec.* 703. D C. Fl. franc. 3699.  
 R. (*Majalis*). HERM. *Diss. de Rosa*, p. 8, n° 3. DESFONT. *Atlant.* 1, p. 400. REG. *Act. Soc. Laus.*, p. 400. *Tab.* 4. MISS. LAW. *Tab.* 34. ROESS. R. *Tab.* 8.  
 R. (*Fecundissima*). DU ROI, *Harbk.* 2, p. 343. ROTH. *Germ.* 2, p. 557. C'est le *Cinnamomea nebulosa* de DU P. cat. ined., 9<sup>e</sup> série, n° 2. Vulg. la Rose de Mai, ou de Pâques, ou du Saint-Sacrement.  
 ζ. R. *Cinnamomea blanda*.  
 R. (*Blanda*) *germinibus globosis glabris, caulibus adultis, pedunculisque levibus inermibus*. AIT. *Kew.* 2, p. 202. MISS. LAW. *Tab.* 27. L'arbrisseau est muni d'aiguillons sur les rameaux florifères pendant toute sa floraison; ils ne tombent qu'après la chute des pétales. Toutefois, bien qu'il ait le port de notre variété, que la couleur du bois soit la même, enfin bien qu'il en soit visiblement une modification, il en diffère cependant par ses folioles presque glabres, plus finement dentées, et par ses fleurs simples et blanches.

\*\*\* Lobes du calice découpés. Rameaux florifères aiguillonnés.

- η. R. *Cinnamomea fluvialis*. Vulg. la Rose de Mai aquatique.  
 R. (*Fluvialis*) *germinibus globosis, pedunculis petiolisque inermibus; caule aculeis sparsis; foliis ovatis, acutis; calycibus linearibus incis.* RETZ. *Prod. scand. Ed. altera*, n° 619. *Fl. Danica*, *Tab.* 868. Cette variété croît, selon WILLDENOW, en Danemarck, et en Suède, dans les lieux aquatiques.